

# 두오필름<sup>®</sup> 겔

일반의약품

## ■원료약품 및 그 분량 : 1 g 중

주성분 : 살리실산(EP) ······ 167mg  
락트산(EP) ······ 167mg

## ■성 상

에테르 냄새가 나는 황색~황갈색의 점성이 있는 액상형태의 투명한 겔제

## ■효능·효과 : 사마귀

## ■용법·용량

1일 1회 2~4방울을 가능한 취침 전 환부(질환 부위)에 바른다.

1. 더운물에 약 5분간 사마귀 부분을 담근 뒤 수건으로 완전히 건조시킨다.
2. 출혈을 조심하면서 사마귀 표면을 손톱 다듬는 줄이나 부석으로 부드럽게 문지른다.
3. 환부(질환 부위)주위의 정상 피부에 닿지 않도록 주의하여 약액을 얇게 바른 후 완전히 건조시킨다. 환부(질환 부위)가 크거나 족부(발)에 위치한 경우 환부(질환 부위)는 반창고로 덮어준다.
4. 완전한 치료를 위해서는 사마귀가 완전히 떨어져 나갈 때까지 매일 한번씩 발라주어야 한다.
5. 치료효과는 보통 1~2주내에 나타나며 치료 4~8주 후부터 최대효과를 기대할 수 있다.

## ■사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것
  - 1) 점, 날 때부터 있는 점, 항문 및 생식기 사마귀, 얼굴 또는 점막에 난 사마귀, 지루성 사마귀, 털이 있는 사마귀, 붉은 가장자리, 변색된 피부
  - 2) 개방창(열린 상처), 자극 받은 혹은 붉어진 피부, 감염된 부위
  - 3) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 사용하지 말 것
  - 1) 이 약은 다른 국소 외용제의 흡수를 증가 시킬 수 있으므로 같은 치료부위에 대해 다른 국소 외용제와의 병용 사용은 피해야 한다.
  - 2) 이 약의 전신적 노출은 적으므로 전신 투여 치료제와의 상호작용은 예상되지 않는다.
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
  - 1) 당뇨병, 혈액순환장애 또는 말초신경병증 환자는 의사의 감독 하에 사용하는 경우 이외에는 권장하지 않는다.
  - 2) 임부 및 수유부에 대한 투여
    - ① 임부  
임부를 대상으로 이 약을 국소적으로 사용 하였을 때 안전성은 확립되어 있지 않다. 동물연구에서 살리실산을 고용량으로 경구 투여(복용) 시 배아독성이 나타났다. 이 약은 임신기간에 권장되지 않는다.
    - ② 수유부  
살리실산은 모유로 이행된다고 보고되었다. 이 약은 수유부에게 권장되지 않는다. 수유기간 동안 투여할 경우, 영아가 사고로 삼키는 것을 피하기 위해 가슴 부위에 적용하지 않도록 주의한다.
  - 3) 소아에 대한 투여
    - ① 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용한다.
    - ② 2세 미만의 소아에게 사용은 권장하지 않는다.
4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것, 상담 시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것
  - 1) 이상반응  
이상반응 발현(발생)빈도는 다음과 같이 분류하였다.  
매우 흔하게( $\geq 1/10$ ), 흔하게( $\geq 1/100$  그리고  $< 1/10$ ), 흔하지 않게( $\geq 1/1,000$ ,  $< 1/100$ ), 드물게( $\geq 1/10,000$  및  $< 1/1,000$ ), 매우 드물게( $< 1/10,000$ )
    - ① 임상시험

DF0001.06  
CW-08-15

면역계	흔하게: 발진
피부 및 피하(피부밑) 조직	매우 흔하게: 적용부위 반응, 가려움, 작열감 (화끈감), 홍반(붉은 반점), 인설(비늘), 피부건조 흔하게: 피부비대

② 시판 후 조사 결과

면역계	드물게: 염증을 포함한 적용부위의 과민반응
피부 및 피하(피부밑) 조직	드물게: 적용부위의 통증과 자극감, 적용부위의 변색/피부변색, 정상피부에 노출 시 물질 및 피 부 박탈, 알레르기 피부염

2) 치료 12주 후에도 사마귀가 지속 될 경우, 의사 또는 약사와 상담하여야 한다.

5. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

- 1) 피부 자극을 일으킬 수 있으므로 정상 피부에 닿지 않도록 한다. 과도한 피부 자극이 발생하면 사용을 중단한다.
- 2) 5cm<sup>2</sup> 이상의 면적에 걸쳐 사마귀가 있는 경우, 살리실산 독성의 잠재적 위험이 있기 때문에 다른 치료법을 고려한다.
- 3) 바이러스성 질환에 감염되어 있는 동안 혹은 직 후에 경구 투여(복용)한 살리실산은 라이증후군과 관련 있기 때문에 국소 살리실산 투여는 이론적으로 위험이 있다. 그러므로 수두, 인플루엔자, 혹은 다른 바이러스 감염을 앓는 중이거나 직 후인 어린이 및 청소년들에게 권장 되지 않는다.
- 4) 증기를 흡입하지 않도록 주의한다.
- 5) 과량 투여시 처치
  - ① 사고로 입으로 삼킬 경우 살리실산 독성증상이 나타날 수 있다. 살리실산독성 또는 살리실산중독 증상이 나타날 위험은 이 약을 과량 투여하거나 장기간 사용했을 때 증가한다. 따라서, 사용기간과 권장되는 투여빈도 준수가 매우 중요하다.
  - ② 적절한 의료기관이 권장하는 방법에 따라 처치하거나 임상적으로 대처를 한다.
- 6) 적용상의 주의
  - ① 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 않는다.
  - ② 이 약은 눈에 자극을 일으킬 수 있다. 눈 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 적용한다. 실수로 눈 및 다른 점막에 닿았을 경우에는 충분한 양의 물로 15분 정도 완전히 씻어낸 후 의사의 지시에 따른다.
  - ③ 환부(질환 부위) 이외의 피부에 닿지 않도록 주의한다.
  - ④ 이 약은 인화성을 띄기 때문에, 이 약을 바르는 동안 및 바른 직후 환자들은 흡연 또는 화기 가까이에 있는 것을 피해야 한다.
6. 저장상의 주의사항
  - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
  - 2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
  - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
  - 4) 화기에 가까이 하지 않는다.
  - 5) 사용하지 않을 경우에는 뚜껑을 잘 닫아둔다.

■저장방법 : 차광, 기밀용기, 실온보관

■포장단위 : 15ml

의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 한다.

® = 등록상표

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 약국, 병의원 등의 개설자에 한하여 구입경로를 통해 교환하여 드립니다. 기타 문의사항은 당사 고객센터로 문의하여 주시기 바랍니다.

첨부문서 최종 개정 연월일 : 2015. 02. 05

이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 [www.gskkorea.co.kr](http://www.gskkorea.co.kr)나 아래 번호에서 확인 할 수 있습니다.

제조사 : Stiefel Laboratories(Ireland) Ltd.  
Finisklin Industrial Estate Sligo Ireland  
수입자 : 글락소 스미스클라인  
서울시 용산구 한강대로 92  
고객센터(수신자 요금부담) : 080-901-4100

DF0001.06  
CW-08-15