

수입완제품

일반의약품



원료약품 및 그 분량

이 약 1g 중
주성분 : 테르비나핀 염산염(별규)..... 10mg
(테르비나핀으로 8.888mg)
첨가제(보존제) : 벤질알코올 10mg

성상

백색의 크림제

효능·효과

- 1. Trichophyton(T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporium canis 및 Epidermophyton floccosum과 같은 피부사상균에 의한 피부진균(곰팡이) 감염증: 족부백선(발백선증, 무좀), 고부백선(대퇴부백선)(안선(사타구니백선)), 체부백선
- 2. Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur)에 의한 어루러기
- 3. 피부칸디다증

용법·용량

1일 1~2회 환부(질환부위)에 바릅니다.
질환에 따른 치료기간은 다음과 같습니다.
1. 족부백선(발백선증, 무좀): 1일 1회, 1주
 주간(발가락사이)형 족부백선(발백선증, 무좀): 1일 2회 1주
 족저형(발바닥) 족부백선: 1일 2회, 2주
2. 체부백선, 고부백선(대퇴부백선)(안선(사타구니선)): 1~2주
3. 피부칸디다증: 1~2주
4. 어루러기: 2주
치료기간 이후에도 임상적인 증상이 개선되지 않으면 진단을 다시 해야 합니다.



사용상 주의사항

- 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
3) 소아
- 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것.
1) 발진을 동반한 과민반응이 나타나는 경우
2) 과도한 자극이 나타나거나 더 심해지는 경우
3) 피부의 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 발진, 홍반(붉은 반점), 가려움, 자극감, 국소의 접촉피부염, 피부 박리(벗겨짐), 상처의 딱지, 색소침착(이상, 자통(刺痛))따르는 것 같은 아픔, 작열감(화끈감)이 적용부위에 나타나는 경우
- 3. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항.
1) 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 말 것.
2) 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진균학적인 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균요법을 시행할 것.
3) 산성에서 칸디다균의 증식이 잘 되므로 칸디다증일 경우에는 산성 비누를 사용하지 말 것.
4) 손상되지 않은 피부에 있어서 이 약의 재흡수율이 낮아서 전신적 효과가 나타날 가능성은 희박하나 상처부위, 넓은 부위, 영아(표면적/체중의 비율 및 배내외의 밀봉 효과)의 경우에는 전신적 효과가 나타날 수 있으므로 주의할 것.
- 4. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)

포장단위

15g



※ 작성년월일 : 2016년 9월 30일

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 제품을 구입하였을 때에는 구입한 약국, 도매상, 병의원을 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 기타 자세한 문의 사항은 당사 고객센터로 문의하여 주시기 바랍니다. (Tel: 080-901-4100)
※ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 자사 홈페이지(www.kr.gsk.com) 또는 식품의약품안전처 온라인약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 통해 확인하실 수 있습니다.
※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
※ 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

전공정위탁제조(제조사)

Novartis Cosumer Health SA, Route de l' Etraz, 1260 Nyon, 스위스

(주)글락소스미스클라인켄슈머헬스케어코리아 제품 사용 중 발생한 유해사례(부작용)은 080-901-4100 또는 kr-medical.drug-safety@gsk.com으로 보고해 주시기 바랍니다.

